

Fluxograma Atendimento PS IIER – caso suspeito Dengue

Critério de definição: febre aferida ou referida E duas ou mais das seguintes manifestações: náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retro-orbitária, petéquias, prova do laço positiva e leucopenia.

Classificação de risco do PS

Tem sinais de alarme ou gravidade?

Não

Sim

Prova do Laço

Negativa – Grupo A

- Alta hospitalar
- Orientar hidratação VO
- Orientação sobre sinais de alarme (procurar PS, caso ocorram)
- Reavaliação a cada 48 horas
- UBS/ Hospital Dia (seg a sex)

Positiva – Grupo B ou com condição especial ou com risco social e com comorbidades*.

- Hemograma
- Hidratação VO
- Reavaliação Hb/Ht
- Se alta, reavaliação diária – UBS/ Hospital Dia (seg a sex)

Grupo C – sinais de alarme e sinais de gravidades ausentes

- Internação – Enfermaria
- Hidratação EV
- Exames complementares

Grupo D – Dengue Grave

- Leito UTI
- Hidratação EV
- Exames complementares

Investigação laboratorial e condutas

Grupo A

- **TR negativo:** preencher Cartão Arboviroses, orientar hidratação via oral e seguimento em UBS ou HD, onde deve realizar sorologia para dengue, a partir do 6º dia de sintomas, para confirmação diagnóstica.
- **TR positivo:** preencher Cartão Arboviroses, orientar hidratação via oral e seguimento em UBS ou HD.

Grupo B

- Iniciar hidratação PS (EV e/ou VO). Repete Hb/Ht após hidratação e resultado do hemograma.
- Se hematócrito cair ou não aumentar e condição clínica do paciente permitir – alta com orientação de retorno na UBS ou HD em 24h.
- Se TR for negativo, orientar que haverá necessidade de nova coleta (sorologia) a partir do 6º dia na UBS OU HD.

Grupo C

- Internação + hidratação EV
- TR Dengue + exames complementares. Se TR Dengue negativo – coleta de sorologia (a partir do 6º dia de sintomas).
- pessoa com potencial de gestar (11 – 49 anos) – colher beta-HCG no PS

Grupo D

- Internação em leito crítico.
- TR Dengue + exames complementares. Se TR Dengue negativo – coleta de sorologia IgM (a partir do 6º dia de sintomas) + PCR Dengue para IAL (preferencialmente até 5º dia de sintomas).
- pessoa com potencial de gestar (11 – 49 anos) – colher beta-HCG no PS

Atendimento médico



- Registrar em todos os casos na ficha de atendimento:
 - ✓ Data do início dos sintomas;
 - ✓ Quais dos sintomas que caracterizam a suspeita clínica o paciente apresenta;
 - ✓ Doenças pré-existentes (comorbidades) e medicações uso contínuo;
 - ✓ Dados de deslocamento (local onde reside, trabalha e viagens recentes);
 - ✓ Resultado da prova do laço (se positiva ou negativa);
 - ✓ Sinais de alarme (grupo C) e sinais de gravidade (grupo D) (se presentes ou não; caso afirmativo, especificar);
 - ✓ Se tomou vacina contra dengue, qual e quando;
 - ✓ Se já teve dengue (caso afirmativo, especificar quando).

***Condições clínicas especiais e/ou risco social ou comorbidades:** lactentes (<24 meses), gestantes, adultos > 65 anos, hipertensão arterial ou outras doenças cardiovasculares graves, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, obesidade, doenças hematológicas crônicas, doença renal crônica, doença ácido péptica, hepatopatias e doenças auto imunes.

Estes pacientes podem apresentar evolução desfavorável.