

## **ORIENTAÇÕES PARA OS GRUPOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (PNI) PARA RECEBER A VACINA DE USO EMERGENCIAL PARA COVID-19 (CORONAVAC):**

**1. *Você é profissional de saúde que está trabalhando diretamente com o cuidado de pacientes com COVID-19?***

Se sim, você pode ser elegível a receber a vacina, se não, aguarde o momento da liberação pelo PNI.

**2. *Já tive COVID-19, posso me vacinar?***

SIM desde que o início dos sintomas tenha ocorrido há pelo menos 4 semanas. Para quem não teve sintomas, 4 semanas a partir do primeiro PCR positivo.

**3. *Estou grávida, e agora?***

As gestantes e lactantes pertencentes ao grupo de risco, a vacinação poderá ser realizada após a avaliação dos riscos e benefícios, em decisão compartilhada entre a mulher e seu médico prescritor (Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia), especialmente no 3º trimestre da gestação.

**4. *Pretendo engravidar, posso me vacinar?***

Não há estudos nesta população.

**5. *Estou amamentando, posso me vacinar?***

Provavelmente sim, no entanto não há estudos nesta população.

**6. *Participei de um estudo de vacina anti-COVID-19, posso me vacinar com a CORONAVAC?***

Não. Espere ser chamado pelo estudo.

**7. *Vivo com HIV, posso me vacinar?***

SIM, desde que esteja com a doença controlada.

**8. *Tenho asma, DPOC, cirrose, diabetes, pressão alta, cardiopatia, epilepsia, tatuagem. Posso me vacinar?***

SIM, desde que esteja com a doença controlada.

**9. *Tratei de câncer, posso me vacinar?***

SIM.

**10. *Estou tratando de câncer, posso me vacinar?***

SIM, contudo a resposta da vacina pode ser inferior.

**11. *Tenho alergia a outras vacinas, posso fazer uso da CORONAVAC?***

SIM, se não houver alergia a qualquer um dos componentes da vacina (hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, e hidróxido de sódio).

**12. Tenho alergia a ovo, posso me vacinar?**

SIM.

**13. Tive febre nas últimas 24 horas (>37,5° C), posso me vacinar com a CORONAVAC?**

NÃO, esperar 24hs afebril para poder receber a vacina, como as recomendações usuais para qualquer vacina.

**14. Estou com febre (> 37,5° C) posso me vacinar com a CORONAVAC?**

NÃO, esperar 24hs afebril para poder receber a vacina.

**15. Tive febre há mais de 24 horas, posso me vacinar com a CORONAVAC?**

SIM.

**16. Tomo corticoide, posso me vacinar?**

SIM, contudo a resposta da vacina pode ser inferior.

**17. Tomo imunossupressor, posso me vacinar?**

SIM, contudo a resposta da vacina pode ser inferior.

**18. Tomo imunobiológico (anticorpos monoclonais) posso me vacinar com a CORONAVAC?**

SIM, contudo a resposta imune da vacina pode ser inferior.

**19. Sou transplantado/a, posso me vacinar?**

SIM, contudo a resposta imune da vacina pode ser inferior.

**20. Tomei outra vacina contra COVID-19, posso me vacinar com a CORONAVAC?**

NÃO, não há estudos sobre intercambialidade.

**21. Tomei vacina contra outras doenças, posso me vacinar com a CORONAVAC?**

SIM, contudo não há estudos, segundo o Ministério da Saúde, preconiza-se o intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina para COVID-19 e outras vacinas.

**22. Tenho uma pessoa imunossuprimida/doente em casa ou próxima, posso me vacinar?**

SIM.

**23. Tomo anticoagulante, ou tenho coagulopatia, posso me vacinar com a CORONAVAC?**

Não há relato de interação entre anticoagulantes e vacinas. Esta vacina, assim como todas as vacinas injetáveis intramusculares, deve ser administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia ou coagulopatias, uma vez que podem ocorrer hemorragias após a aplicação IM nestes pacientes. Fazer compressa gelada no local por 5 minutos após a aplicação, se possível, ou realizar curativo compressivo

**24. Sou idoso/a, posso me vacinar com a CORONAVAC?**

SIM, contudo não há dados robustos de eficácia da vacina nesta população.

**25. Tenho uma doença autoimune, posso me vacinar com a CORONAVAC?**

Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença controlada ou em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão ou

ausência de imunossupressão. A resposta imune da vacina pode ser inferior nessa população.

**26. Tomo imunoglobulina, posso me vacinar com a CORONAVAC?**

SIM, após pelo menos 30 dias de intervalo da última dose de Imunoglobulina.

**27. Tenho silicone no local de injeção, posso me vacinar com a CORONAVAC?**

SIM. Escolha outro local de aplicação.

**28. Estou tomando antibiótico, posso me vacinar com a CORONAVAC enquanto estiver tomando esta medicação?**

SIM.

### **QUANDO SERÁ A PRÓXIMA DOSE?**

Entre 14 e 28 dias, PNI recomenda 28 dias.

### **QUAIS SÃO OS REAÇÕES ADVERSAS QUE PODEM OCORRER?**

- **Reação muito comum (> 1/10)**
  - o Sistêmica: cefaleia, fadiga
  - o Local: dor
  
- **Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10)**
  - o Sistêmica: náusea, diarreia, mialgia, calafrios, perda de apetite, tosse, artralgia, prurido, rinorreia, congestão nasal
  - o Local: eritema, inchaço, endureção, prurido
  
- **Reação incomum (> 1/1000 e ≤ 1/100)**
  - o Sistêmica: vômito, febre, exantema, reação alérgica, dor orofaríngea, odinofagia, espirros, astenia, tontura, dor abdominal, sonolência, mal estar, rubor, dor nas extremidades, dor abdominal superior, dor nas costas, vertigem, dispneia, edema,
  - o Local: hematoma

**DESCONHECIDOS:** É uma vacina nova, podem ocorrer efeitos desconhecidos até o momento

**FIQUEI COM DOR INTENSA NO LOCAL DA VACINA:** Colocar compressa fria no local e tomar analgésico

**ESTOU COM MUITOS EFEITOS COLATERAIS SISTÊMICOS (fora da área de vacinação)**  
Procurar o CRIE, ou a medicina do trabalho

### **APÓS COMPLETAR A VACINAÇÃO, POSSO PEGAR COVID-19?**

Sim. A vacina apresentou uma eficácia de 50,4% no estudo fase 3 no Brasil, e o vírus continua circulando

#### **Você deverá continuar a:**

- Evitar aglomeração;
- Manter distanciamento das pessoas;
- Evitar ambientes fechado;
- Usar máscara.