

Orientações para precauções e isolamentos de bactéria multirresistente na pandemia de COVID

Em decorrência da situação epidemiológica da COVID e aumento de colonização/infecção por bactérias multirresistentes em pacientes internados no Instituto de Infectologia Emilio Ribas orientamos as seguintes estratégias para alocação dos pacientes:

- **São consideradas bactérias multirresistentes no IIER:**
 - *Acinetobacter* spp resistentes a carbapenêmicos (mero ou e imipenem) e/ou resistentes a polimixinas
 - *Pseudomonas aeruginosa* resistentes a carbapenêmicos (mero ou eimipenem) e/ou resistentes a polimixinas
 - Enterobacterias (*Klebsiella*, *E. coli*, *Enterobacter*, *Serratia*, etc) resistentes a carbapenêmicos (mero, ertapenem ou imipenem) e/ou resistentes a polimixinas
 - *Stenotrophomonas maltophilia* e *Burkholderia cepacea* (independente do perfil de sensibilidade)
 - *Enterococos* e *S.aureus* resistentes a glicopeptídeo (teico, vanco ou daptomicina)

- **No caso de paciente colonizado/infetado por pelo menos 1 bactéria MR**, dar preferência para internação do mesmo em quarto privativo. Se o paciente estiver na UTI, aloca-lo preferencialmente na UTI do 2º andar.

- **Se houver necessidade de fazer coorte de pacientes** (se não houver vaga individual), seguir os seguintes critérios:
 - Isolar em coorte o mesmo microrganismo com resistência principal semelhante (Ex.: dois casos de *Klebsiella* spp resistente a carbapenêmicos ou dois casos de *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenêmicos)
 - Se o paciente tiver colonização/infecção por mais de uma bactéria MR deixá-lo obrigatoriamente em quarto privativo.

- **No caso de paciente transferido da UTI para enfermaria**, as seguintes situações estão previstas:
 - Alta da UTI em precaução padrão, já tendo último resultado de swab sem bactéria MR e sem coleta nova (colheu na terça e a transferência ocorreu na sexta ou sábado):
 - Colher novo swab retal na enfermaria e não isolar o caso:
 - Ação de acordo com o resultado:
 - Se swab com agente MR acima – precaução de contato preferencialmente em quarto privativo se houver necessidade de fazer coorte, seguir os critérios acima.
 - Se swab negativo para agente MR: manter precaução padrão.
 - Alta da UTI em precaução padrão, mas aguarda o resultado do ultimo swab coletado (manter na enfermaria em precaução padrão ate saída de resultado)
 - Ação de acordo com o resultado:

- Se swab com agente MR acima – precaução de contato preferencialmente em quarto privativo se houver necessidade de fazer coorte, seguir os critérios acima.
- Se swab negativo para agente MR: manter precaução padrão.

Obs: para pacientes transferidos de outros hospitais atentar-se para **o início obrigatório de isolamento de contato, preferencialmente em quarto privativo**, coleta de swab de vigilância retal e de outros sítios de acordo com a presença de dispositivos e aguardar o resultado final (ver Manual de isolamento do IIER - Intranet).

Na impossibilidade de quarto privativo – realizar isolamento de contato no leito até resultado do swab de vigilância e buscar manter funcionários diferentes para os cuidados de pacientes no mesmo quarto.

- Ação de acordo com o resultado:
- Se swab com agente MR acima – precaução de contato preferencialmente em quarto privativo se houver necessidade de fazer coorte, seguir os critérios acima.
- Se swab negativo para agente MR: manter precaução padrão.

Equipe SCIH

Elaborado em 10/09/2020

Revisado e atualizado em 12/03/2021